

Analyses de sang pour vérifier le fonctionnement de votre foie

Quelques patients traités par BOSENTAN SANDOZ ont présenté des anomalies du bilan hépatique.

Pendant le traitement par BOSENTAN SANDOZ, votre médecin vous prescrira des analyses de sang régulières pour vérifier le fonctionnement de votre foie.

N'oubliez pas de faire un bilan hépatique tous les mois.

Un bilan supplémentaire sera réalisé 2 semaines après toute augmentation de la posologie de BOSENTAN SANDOZ.

Date du premier bilan hépatique :

VOTRE CALENDRIER DES BILANS HÉPATIQUES MENSUELS :

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Jan. | <input type="checkbox"/> Mai | <input type="checkbox"/> Sept. |
| <input type="checkbox"/> Fév. | <input type="checkbox"/> Juin | <input type="checkbox"/> Oct. |
| <input type="checkbox"/> Mars | <input type="checkbox"/> Juil. | <input type="checkbox"/> Nov. |
| <input type="checkbox"/> Avril | <input type="checkbox"/> Août | <input type="checkbox"/> Déc. |

A20013030/00 ETI-SDZ-910-A

CARTE DE SIGNAL PATIENT

Alertes importantes pour la sécurité d'emploi de BOSENTAN SANDOZ (bosentan)

Cette carte contient des informations importantes concernant BOSENTAN SANDOZ. Lire attentivement cette carte avant de commencer votre traitement par BOSENTAN SANDOZ.

Votre nom :

Votre médecin traitant :

Si vous avez des questions concernant BOSENTAN SANDOZ
n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin.

SANDOZ A Novartis
Division

Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants merci de lire cette page attentivement.

Grossesse

BOSENTAN SANDOZ peut nuire au développement de votre futur bébé. En conséquence, vous ne devez pas prendre BOSENTAN SANDOZ si vous êtes enceinte et vous ne devez pas non plus tomber enceinte pendant que vous êtes traitée par BOSENTAN SANDOZ.

En outre, si vous souffrez d'une hypertension artérielle pulmonaire, la survenue d'une grossesse peut aggraver les symptômes de votre maladie. Si vous pensez être enceinte, informez votre médecin ou votre gynécologue.

Contraception

Une contraception basée sur des hormones, tels que des contraceptifs oraux ou une pilule contraceptive, des injections, un implant hormonal, ou une contraception par patch ne suffit pas à elle seule à assurer une contraception efficace chez les femmes qui sont traitées par BOSENTAN SANDOZ. Vous devez y associer un mode de contraception mécanique tel qu'un préservatif, un diaphragme ou une éponge vaginale. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir à votre médecin ou à votre gynécologue. Remplissez le verso de cette carte et donnez-la à votre médecin ou à votre gynécologue à votre prochaine visite.

Vous devez faire un test de grossesse avant l'initiation d'un traitement par BOSENTAN SANDOZ et chaque mois pendant tout le traitement même si vous pensez que vous n'êtes pas enceinte.

Date du premier test mensuel :

Contraception

Utilisez-vous ou prenez-vous des contraceptifs ?

Oui

Non

Si oui, écrivez les noms de ces contraceptifs ici :

.....
.....
.....
.....

Prenez cette carte avec vous lors de votre prochaine visite chez votre médecin ou votre gynécologue. Il/Elle pourra vous conseiller si vous avez besoin d'utiliser une méthode de contraception complémentaire ou alternative.