

IMPORTANT – CARTE DE MISE EN GARDE
Abacavir Sandoz® 300 mg, comprimé pelliculé sécable

Conservez cette carte sur vous en permanence

Abacavir Sandoz 300 mg, comprimé pelliculé sécable contient de l'abacavir, certains patients prenant Abacavir Sandoz peuvent donc présenter une réaction d'hypersensibilité (réaction allergique grave) qui **peut menacer le pronostic vital** en cas de poursuite du traitement avec Abacavir Sandoz. **CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN** qui vous indiquera si vous devez **arrêter de prendre Abacavir Sandoz, si :**

1. vous présentez une éruption cutanée OU,

2. vous présentez des symptômes appartenant à au moins DEUX des catégories suivantes :

- fièvre,
- essoufflement, maux de gorge ou toux,
- nausées ou vomissements ou diarrhée ou douleurs abdominales,
- fatigue ou courbatures sévères ou sensation de malaise général.

Si vous avez arrêté le traitement par Abacavir Sandoz en raison de cette réaction, **VOUS NE DEVEZ JAMAIS REPRENDRE** ni Abacavir Sandoz ni aucun médicament contenant de l'abacavir (ex. : abacavir/lamivudine, lamivudine/zidovudine/abacavir, dolutégravir/abacavir/lamivudine) car cela peut entraîner **dans les heures** qui suivent une chute de votre pression artérielle mettant en jeu le pronostic vital, voire le décès.



Contactez immédiatement votre médecin si vous suspectez une réaction d'hypersensibilité à Abacavir Sandoz.

Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées de votre médecin :

Docteur :

Tél. :

En cas d'absence de celui-ci, veuillez contacter immédiatement un autre médecin pour un avis médical (par exemple : service des urgences de l'hôpital le plus proche).

Pour toutes informations générales concernant Abacavir Sandoz, contactez : Sandoz France Tél : 0 800 455 799.

SANDOZ A Novartis
Division

ETI-SDZ-916-A

