

## Carte de surveillance du patient

Cette carte contient des informations importantes de sécurité que vous devez prendre en considération avant et pendant votre traitement par Erelzi® (étanercept). Demandez à votre médecin de vous donner plus d'explications si vous ne comprenez pas ces informations.

- Montrez cette carte à tout médecin intervenant dans votre traitement.
- Consultez la notice d'Erelzi® pour plus d'information.

MMR17010/1 - Novembre 2017

### Utilisation chez les enfants et adolescents (pesant moins de 62,5 kg)

Erelzi® ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents pesant moins de 62,5 kg. Veuillez consulter votre médecin si vous avez des questions à ce sujet.

### Infections

Erelzi® peut augmenter le risque d'infections, qui peuvent être graves.

- Vous ne devez pas prendre Erelzi® si vous souffrez d'une infection. En cas de doutes, demandez l'avis de votre médecin
- Si vous présentez des symptômes évocateurs d'une infection tels que de la fièvre, une toux persistante, une perte de poids ou une fatigue extrême, consultez immédiatement un médecin.
- Vous devez être examiné concernant la tuberculose (TB). Demandez à votre médecin d'enregistrer ci-dessous les dates et les résultats de votre dernier dépistage de la TB :

Test : .....

Date : .....

Résultats : .....

Test : .....

Date : .....

Résultats : .....

Veillez demander à votre médecin de lister tous les autres médicaments que vous prenez qui pourraient augmenter votre risque d'infection.

## Insuffisance cardiaque congestive

Si vous développez des symptômes **évoquant une insuffisance cardiaque congestive ou l'aggravation d'une insuffisance cardiaque congestive existante**, tels qu'essoufflement, gonflement des chevilles, toux persistante ou fatigue, consultez immédiatement un médecin.

## Autres informations (à compléter)

Nom du patient : .....

Nom du médecin : .....

Numéro de téléphone du médecin : .....

**Conservez cette carte avec vous pendant la durée de votre traitement et 2 mois après la dernière dose d'Erelzi<sup>®</sup>, car des effets indésirables peuvent survenir après l'arrêt de votre traitement par Erelzi<sup>®</sup>.**

Important : notez ci-dessous le nom de marque et le numéro de lot de votre médicament.

.....

.....

.....