



Sandoz France

Vinorelbine Sandoz[®] **Capsule molle - Voie orale**

**Livret d'information et de suivi
pour vous accompagner dans
la prise de votre traitement**

V1 - Mai 2020

Diffusé sous l'autorité de l'ANSM

SANDOZ A Novartis
Division

Nom :

Prénom :

Ce livret d'information et de suivi s'adresse au patient ainsi qu'à son entourage.

Votre médecin vous a prescrit VINORELBINE Sandoz®, un traitement essentiel pour traiter votre maladie.

VINORELBINE Sandoz® se présente sous forme de capsules molles qui doivent être prises par voie orale.

Seul votre spécialiste hospitalier est habilité à prescrire et renouveler votre traitement par VINORELBINE Sandoz®.

Votre traitement sera délivré par votre pharmacien d'officine habituel, sur présentation de l'ordonnance de votre spécialiste.

Ce traitement nécessite une vigilance particulière et un suivi régulier.

Ce livret a été élaboré pour vous accompagner tout au long de votre traitement.

Il vous rappelle :

- Comment prendre votre traitement
- Comment surveiller les effets indésirables

Il doit vous aider au bon usage de votre médicament.

Des pages sont consacrées au suivi de votre traitement.

Vous devez les compléter avec l'équipe soignante puis y reporter toutes vos observations pendant votre traitement.

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Il est important de compléter régulièrement ce livret et de l'apporter à chaque consultation et à la pharmacie.

Pour plus d'information, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/> ou flasher les QR codes disponibles à la fin de ce document.

Si vous avez d'autres questions, en cas de doute ou pour plus d'informations, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Coordonnées utiles

Médecin prescripteur

Nom :

Hôpital :

Service :

Adresse :

N° de téléphone :

Cachet

Hôpital de jour

Nom du cadre de santé :

N° de téléphone :

Pharmacien

Nom :

Adresse :

N° de téléphone :

Infirmière

Nom :

Adresse :

N° de téléphone :

Médecin traitant

Nom :

Adresse :

N° de téléphone :

VINOURELBINE Sandoz® s'administre **une fois par semaine au maximum** (= prise hebdomadaire) **et à jour fixe**. Ce jour sera à déterminer avec votre médecin.

Les capsules molles de VINOURELBINE Sandoz® sont disponibles en différents dosages (20 mg et 30 mg) afin que la dose individuelle puisse être ajustée avec précision.

Votre dose de VINOURELBINE Sandoz® sera calculée en fonction de votre taille et de votre poids.

Votre médecin vous prescrira le nombre et le dosage de capsule molle que vous devez prendre idéalement au moment des repas.

La dose totale ne doit jamais dépasser 160 mg par semaine.

Le traitement qui vous est prescrit est de longue durée.
Il comporte **plusieurs cures ou « cycles »**.

Les cycles sont habituellement de 3 semaines (= 1 prise par semaine pendant 3 semaines) et peuvent être :

- **continus** : le traitement est pris sans interruption de façon hebdomadaire, avec une réévaluation médicale toutes les 3 semaines,
- **discontinus** : une interruption du traitement (pause) a lieu après chaque cycle de 3 prises hebdomadaires. Cette pause peut durer une ou plusieurs semaines.

Une évaluation sera effectuée par votre médecin après chaque cycle.
La durée totale de traitement (nombre de cycles) sera déterminée par votre médecin.

Une **prise de sang** doit être effectuée **avant le début du traitement puis chaque semaine**, avant toute nouvelle prise, que le traitement soit administré en cycles continus ou discontinus.

En fonction des résultats de ces bilans sanguins hebdomadaires et de la façon dont vous tolérez votre traitement, votre médecin pourra, au cours des cycles de traitement, adapter votre dose ou reporter une prise.

Exemple du déroulement d'un traitement continu

CYCLE N°1

Semaine 1

CONSULTATION spécialiste :

- Prise de sang
- Prescription du traitement
Prise du traitement

Semaine 2

- Prise de sang
- Avis médical
Prise du traitement

Semaine 3

- Prise de sang
- Avis médical
Prise du traitement

CYCLE N°2

Semaine 4

CONSULTATION spécialiste :

- Prise de sang
- Prescription du traitement
Prise du traitement

Semaine 5

- Prise de sang
- Avis médical
Prise du traitement

Etc..

Exemple du déroulement d'un traitement **discontinu**

CYCLE N°1

Semaine 1

CONSULTATION spécialiste :

- Prise de sang
- Prescription du traitement
- Prise du traitement

Semaine 2

- Prise de sang
- Avis médical
- Prise du traitement

Semaine 3

- Prise de sang
- Avis médical
- Prise du traitement

Interruption (pause)

Pas de prise de traitement
(... semaines)

CYCLE N°2

Semaine 1

CONSULTATION spécialiste :

- Prise de sang
- Prescription du traitement
- Prise du traitement

Semaine 2

- Prise de sang
- Avis médical
- Prise du traitement

Semaine 3

- Prise de sang
- Avis médical
- Prise du traitement

Interruption (pause)

Pas de prise de traitement
(... semaines)

Cycle n°3 = Cycle n°2, etc.


Conservation des capsules de Vinorelbine Sandoz®

Les capsules de VINOURELBINE Sandoz® doivent être **conservées au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C)** dans leur plaquette soigneusement fermée.


Prévoir un **sac isotherme** pour le transport.



Ouverture de l'emballage



- 1 Découper la plaquette avec des ciseaux en suivant le trait noir.



- 2 Enlever le film blanc.



- 3 Expulser la capsule au travers du feuillet d'aluminium. Vous pouvez ainsi l'introduire directement dans votre bouche pour ensuite l'avaler à l'aide d'un verre d'eau froide.

Ne pas utiliser si vous constatez un écrasement ou une fuite du liquide de la capsule.



- 4 Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé la capsule molle de VINORELBINE Sandoz®.

Comment prendre votre traitement ?

Votre médecin doit d'abord vérifier chaque semaine les résultats de votre prise de sang, avant de vous autoriser à prendre votre traitement.

- Prendre VINORELBINE Sandoz® au cours d'un repas léger ou d'une collation.
- Vérifier que les capsules sont intactes avant d'ouvrir la plaquette contenant VINORELBINE Sandoz®, capsule molle.
- Ne pas prendre de capsules endommagées (capsules écrasées ou fendues ou fuite de liquide de la capsule).
- Ne pas mâcher, ni sucer, ni dissoudre les capsules.
- Avaler les capsules en entier avec un verre d'eau froide non gazeuse, mais en aucun cas avec une boisson chaude.
- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des capsules.
- Bien respecter les jours de prise.

Si vous constatez qu'une capsule est abîmée, refermez soigneusement l'emballage et rapportez-le à votre pharmacien ou à votre médecin.

En cas de contact du liquide de la capsule avec la peau, les muqueuses (bouche) ou les yeux, rincez immédiatement et soigneusement avec de l'eau ou de préférence du sérum physiologique ou une solution saline isotonique.

Il ne faut pas jeter VINORELBINE Sandoz® au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

À ne pas faire

Ne pas laisser ce traitement à la portée de tous, et en particulier **des enfants**.

Ne pas prendre d'autre médicament sans l'accord de votre médecin.

Prévenez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, avant et pendant le traitement par VINOELBINE Sandoz®, **y compris ceux disponibles sans ordonnance** et à base de plantes.

En effet, certains médicaments sont contre-indiqués avec la prise de VINOELBINE Sandoz® et/ou peuvent modifier son activité.

Ne pas utiliser VINOELBINE Sandoz®, capsule molle si vous constatez un écrasement ou une fuite du liquide de la capsule.

Ne pas prendre VINOELBINE Sandoz® si vous n'avez pas conservé vos capsules au réfrigérateur pendant une période prolongée. Dans ce cas, ou en cas de doute, **contactez votre pharmacien.**

Ne jamais arrêter votre traitement et ne jamais modifier le rythme d'administration sans l'avis de votre médecin.

Ne jamais augmenter le nombre de capsules, même pour rattraper un oubli.

En cas de vomissements dans les quelques heures suivant la prise, **ne jamais répéter l'administration de cette même dose**, cela peut être dangereux.

En cas d'oubli ou de vomissement après une prise, contactez immédiatement votre médecin.

Pour plus d'information, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/> ou flashez les QR codes disponibles à la fin de ce document.

Précautions particulières

Si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou prévoyez de le devenir, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament, car il peut y avoir des risques pour l'enfant.

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace avant de commencer le traitement, pendant le traitement, et jusqu'à trois mois après l'arrêt du traitement.

Si une grossesse survient pendant le traitement, informez votre médecin immédiatement.

Vous ne devez pas allaiter si vous prenez VINOELBINE Sandoz®, capsule molle.

Il est conseillé aux hommes traités avec VINOELBINE Sandoz®, capsule molle de ne pas procréer pendant le traitement et ce jusqu'à six mois après l'arrêt du traitement et de se renseigner sur la conservation du sperme avant le traitement par VINOELBINE Sandoz®.

Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise afin d'éviter une contamination accidentelle.

En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).

Surveillance et suivi de votre traitement

Comme tous les médicaments, ce traitement peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Tout effet indésirable doit être noté dans les tableaux de suivi pour aider votre médecin à en améliorer la prise en charge.

VINOURELBINE Sandoz® peut principalement provoquer :

Une diminution du nombre de cellules sanguines

On peut principalement observer une baisse des globules blancs, ce qui peut provoquer de la fièvre et augmenter le risque d'infections par des bactéries, virus ou champignons (infections urinaires, pulmonaires ou autres).

On peut aussi observer de la fatigue, une anémie (baisse des globules rouges) ou des saignements (baisse des plaquettes).

- La baisse des cellules sanguines est surveillée grâce aux prises de sang régulières.
- Si vous prenez des médicaments pour fluidifier le sang (par exemple des médicaments anticoagulants comme phénoprocoumone, warfarine...) une surveillance étroite de la coagulation sanguine est nécessaire pendant le traitement par ces médicaments.

Des affections gastro-intestinales

De type diarrhées ou constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales

- Des précautions alimentaires telles qu'une alimentation riche en fibres, des repas légers et fractionnés et une bonne hydratation peuvent suffire.
- Évitez les aliments frits, gras, épicés ou glacés, l'alcool.
- En cas de persistance, votre médecin pourra vous prescrire des traitements pour diminuer ces symptômes.

On observe aussi souvent :

- des **irritations** ou **inflammations** des muqueuses de la bouche (mucite, **aphtes**) et de l'**œsophage** ("**brûlures**"),
- des **douleurs articulaires** (mâchoire) ou musculaires,
- une augmentation (**tension élevée**) ou une chute (**hypotension**) de la pression artérielle,
- des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision,
- des réactions allergiques au niveau de la peau (irritations, rougeurs ...).

Si vous développez un de ces effets, ou tout autre effet indésirable :

Notez-les dans ce livret et n'hésitez pas à contacter votre médecin. Il pourra vous proposer une solution pour les prendre en charge ou adapter votre traitement (diminution de votre dose ou interruption du traitement).

Une prise en charge rapide par votre médecin permettra d'éviter une aggravation de ces symptômes.

Signes d'alerte

Pendant le traitement avec VINOURELBINE Sandoz®, capsule molle, **si vous développez l'un des symptômes suivants, vous devez contacter immédiatement votre médecin en cas de :**

- signes d'infection sévère tels que toux, fièvre et frissons.
ATTENTION : si une infection survient, elle peut devenir sévère.
- constipation sévère avec douleurs abdominales quand vous n'êtes pas allé à la selle durant plusieurs jours.
- vertiges ou étourdissements sévères lors du passage à la position debout, qui peuvent être le signe d'une baisse importante de votre pression sanguine.
- douleur thoracique sévère inhabituelle, qui peut être due à un mauvais fonctionnement du cœur suite à un flux sanguin réduit (maladie cardiaque ischémique).
- signes d'allergie tels que difficultés respiratoires, vertiges, baisse de la pression sanguine, une éruption cutanée sur votre corps entier, un gonflement des paupières, des lèvres ou de la gorge.

Pour la liste complète des effets indésirables, consultez la notice dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/> ou flashez les QR codes disponibles à la fin de ce document.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Vous pouvez déclarer tout effet indésirable ou tout risque d'erreur médicamenteuse sur le portail : www.signalement-sante.gouv.fr

Tableau de suivi de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous.
N'oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Cycle n°1

Traitement continu

Traitement discontinu

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise	Jour de prise (prendre Vinorelbine Sandoz® avec un repas léger ou une collation)	Dose prescrite (à remplir par votre pharmacien)	Date du bilan sanguin	Nombre de capsules prises de 20mg (à remplir au moment de la prise)	Nombre de capsules prises de 30mg	Observations sur votre état général, liste des effets indésirables survenus, raison de non prise du traitement	Autre(s) traitement(s) pris
Semaine 1 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 2 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 3 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 4 (en fonction de la prescription) Prise du médicament / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
ou Interruption de traitement du / /							
au / /							

Tableau de suivi de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous.
N'oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Cycle n°2

Traitement continu

Traitement discontinu

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise	Jour de prise (prendre Vinorelbine Sandoz® avec un repas léger ou une collation)	Dose prescrite (à remplir par votre pharmacien)	Date du bilan sanguin	Nombre de capsules prises de 20mg (à remplir au moment de la prise)	Nombre de capsules prises de 30mg	Observations sur votre état général, liste des effets indésirables survenus, raison de non prise du traitement	Autre(s) traitement(s) pris
Semaine 1 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 2 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 3 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 4 (en fonction de la prescription) Prise du médicament / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
ou Interruption de traitement du / /							
au / /							

Tableau de suivi de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous.
N'oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Cycle n°3

Traitement continu

Traitement discontinu

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise	Jour de prise (prendre Vinorelbine Sandoz® avec un repas léger ou une collation)	Dose prescrite (à remplir par votre pharmacien)	Date du bilan sanguin	Nombre de capsules prises de 20mg (à remplir au moment de la prise)	Nombre de capsules prises de 30mg (à remplir au moment de la prise)	Observations sur votre état général, liste des effets indésirables survenus, raison de non prise du traitement	Autre(s) traitement(s) pris
Semaine 1 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 2 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 3 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 4 (en fonction de la prescription) Prise du médicament / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
ou Interruption de traitement du / /							
au / /							

Tableau de suivi de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous.
N'oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Cycle n°4

Traitement continu

Traitement discontinu

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise	Jour de prise (prendre Vinorelbine Sandoz® avec un repas léger ou une collation)	Dose prescrite (à remplir par votre pharmacien)	Date du bilan sanguin	Nombre de capsules prises de 20mg (à remplir au moment de la prise)	Nombre de capsules prises de 30mg	Observations sur votre état général, liste des effets indésirables survenus, raison de non prise du traitement	Autre(s) traitement(s) pris
Semaine 1 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 2 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 3 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 4 (en fonction de la prescription) Prise du médicament / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
ou Interruption de traitement du / /							
au / /							

Tableau de suivi de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous.
N'oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Cycle n°5

Traitement continu

Traitement discontinu

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise	Jour de prise (prendre Vinorelbine Sandoz® avec un repas léger ou une collation)	Dose prescrite (à remplir par votre pharmacien)	Date du bilan sanguin	Nombre de capsules prises de 20mg (à remplir au moment de la prise)	Nombre de capsules prises de 30mg	Observations sur votre état général, liste des effets indésirables survenus, raison de non prise du traitement	Autre(s) traitement(s) pris
Semaine 1 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 2 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 3 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 4 (en fonction de la prescription) Prise du médicament / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
ou Interruption de traitement du / /							
au / /							

Tableau de suivi de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous.
N'oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Cycle n°6

Traitement continu

Traitement discontinu

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise	Jour de prise (prendre Vinorelbine Sandoz® avec un repas léger ou une collation)	Dose prescrite (à remplir par votre pharmacien)	Date du bilan sanguin	Nombre de capsules prises de 20mg (à remplir au moment de la prise)	Nombre de capsules prises de 30mg	Observations sur votre état général, liste des effets indésirables survenus, raison de non prise du traitement	Autre(s) traitement(s) pris
Semaine 1 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 2 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 3 / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
Semaine 4 (en fonction de la prescription) Prise du médicament / /	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Dose totale :mg Répartition : Capsules 20 mg :mg Capsules 30 mg :mg / /				
ou Interruption de traitement du / /							
au / /							

Notes



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notice

Vous trouverez les informations relatives à la notice de **VINORELBINE Sandoz® 20 mg, capsule molle** en flashant le QR code suivant :



Vous trouverez les informations relatives à la notice de **VINORELBINE Sandoz® 30 mg, capsule molle** en flashant le QR code suivant :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Vous pouvez déclarer tout effet indésirable ou tout risque d'erreur médicamenteuse sur le portail : www.signalement-sante.gouv.fr

SANDOZ
49, avenue Georges Pompidou
92 593 Levallois-Perret Cedex
SAS au capital de 5 402 439 euros
RCS Nanterre 552 123 341



366518400009

SANDOZ A Novartis
Division

www.sandoz.fr