

Cette carte contient des informations importantes de sécurité que vous devez prendre en considération avant et pendant votre traitement par Erelzi[®] (étanercept). Demandez à votre médecin de vous donner plus d'explications si vous ne comprenez pas ces informations.

- Montrez cette carte à tout médecin intervenant dans votre traitement.
- Consultez la notice d'Erelzi[®] pour plus d'information.

Ce médicament est un biosimilaire.

Ce document est diffusé sous l'autorité de l'ANSM.

MLRID 286548 - Mai 2023

Utilisation chez les enfants et adolescents (pesant moins de 62,5 kg)

Erelzi[®] ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents pesant moins de 62,5 kg. Veuillez consulter votre médecin si vous avez des questions à ce sujet.

Insuffisance cardiaque congestive

Si vous développez des symptômes **évoquant une insuffisance cardiaque congestive ou l'aggravation d'une insuffisance cardiaque congestive existante**, tels qu'essoufflement, gonflement des chevilles, toux persistante ou fatigue, consultez immédiatement un médecin.

Infections

Erelzi[®] peut augmenter le risque d'infections, qui peuvent être graves.

- Vous ne devez pas prendre Erelzi[®] si vous souffrez d'une infection. En cas de doutes, demandez l'avis de votre médecin.
- Si vous présentez des symptômes évocateurs d'une infection tels que de la fièvre, une toux persistante, une perte de poids ou une fatigue extrême, consultez immédiatement un médecin.
- Vous devez être examiné concernant la tuberculose (TB). Demandez à votre médecin d'enregistrer ci-dessous les dates et les résultats de votre dernier dépistage de la TB :

Test :

Date :

Résultats :

Test :

Date :

Résultats :

Veillez demander à votre médecin de lister tous les autres médicaments que vous prenez qui pourraient augmenter votre risque d'infection.

.....
.....
.....
.....

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>.
Pour plus d'information, consulter la rubrique "Déclarer un effet indésirable" sur le site Internet de l'ANSM : <https://ansm.sante.fr>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Autres informations (à compléter)

Nom du patient :

Nom du médecin :

Numéro de téléphone du médecin :

Conservez cette carte avec vous pendant la durée de votre traitement et 2 mois après la dernière dose d'Erelzi[®], car des effets indésirables peuvent survenir après l'arrêt de votre traitement par Erelzi[®].

Important : notez ci-dessous le nom de marque et le numéro de lot de votre médicament.

.....
.....
.....

